

KS.02.0531.13.2026

Informacja dotycząca ptasiej grypy u dzikich ptaków w Krakowie. Zasady, jakich należy przestrzegać

Wojewoda małopolski podpisał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego, wielickiego i miasta Krakowa. Wirus jest niebezpieczny dla drobiu i może powodować duże straty gospodarcze.

Co robić, gdy znajdziesz martwego lub chorego ptaka?

- **Nie dotykaj ptaków:** bezwarunkowo nie dotykaj martwych, chorych lub sprawiających wrażenie osłabionych dzikich ptaków (dotyczy to głównie ptactwa wodnego: łabędzi, kaczek, gęsi, a także mew i ptaków drapieżnych).
- **Zgłoś znalezisko:** każdy przypadek znalezienia martwego dzikiego ptaka należy niezwłocznie zgłosić do:
 - MPO Kraków, nr tel. 12 646 22 77
 - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie, nr tel. 12 411, 25 69 lub 690 999 857
 - straży miejskiej, nr tel. 986
- **Zabezpiecz teren znaleziska:** jeśli to możliwe do czasu przyjazdu służb zabezpiecz dostęp do martwego ptaka dzieciom oraz zwierzętom domowym.

Zachowanie w miejscach występowania ptaków (stawy, parki, rzeki)

- Unikaj bezpośredniego kontaktu: unikaj miejsc gdzie gromadzi się dzikie ptactwo.
- Nie dokarmiaj: w okresie zagrożenia wystąpienia i wystąpienia choroby zaleca się zaniechanie dokarmiania dzikich ptaków, co zmniejsza ich koncentrację, wzajemnego zarażania i ryzyko rozprzestrzeniania wirusa.
- Zdezynfekuj obuwie: jeśli spacerowałeś w miejscu, gdzie znajdowały się odchody ptasie, po powrocie do domu umyj i zdezynfekuj obuwie. Wirus może być przenoszony na podszwach.

Zasady dla mieszkańców (szczególnie terenów wiejskich)

- Izolacja drobiu: hodowcy drobiu (nawet małych, przydomowych stad) powinni trzymać drób w zamknięciu, uniemożliwiając kontakt z dzikimi ptakami.
- Karmienie/pojenie w zamknięciu: pasza i woda dla drobiu powinny być przechowywane w miejscach zamkniętych, niedostępnych dla dzikiego ptactwa.
- Higiena: przed wejściem do kurnika zmień obuwie i odzież wierzchnią, stosuj maty dezynfekcyjne przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich nasączone środkiem dezynfekcyjnym.

Bezpieczeństwo żywności

- Wirus ginie w wysokiej temperaturze: wirus grypy ptaków jest wrażliwy na powszechnie stosowane detergenty oraz temperaturę. Obróbka termiczna (smażenie, gotowanie, pieczenie) w temperaturze minimum 70°C zabija wirusa.
- Higiena w kuchni: należy zachować higienę przy obsłudze surowego mięsa drobiowego (mycie rąk, narzędzi).

Jeśli miałaś/eś kontakt z martwym ptakiem?

- Należy niezwłocznie umyć ręce wodą z mydłem, a ubranie wyprać.
- W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych (gorączka, kaszel, bóle mięśni) po kontakcie z podejrzanym ptakiem, należy udać się do lekarza, informując go o zaistniałej sytuacji.

Więcej informacji: na stronie **Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie** oraz **Głównego Inspektoratu Weterynarii**.

Przemysław Walaszczyk

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej